

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO


FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

“Ing. Néstor R. Ledesma”

Curso de Ingreso 2020

GUÍA TEÓRICA-PRÁCTICA

QUÍMICA



DOCENTES:

Lic. HÉCTOR R. TÉVEZ

Lic. KARINA DEL V. RONDANO

Lic. DANIELA P. BASUALDO



FCF·UNSE

CONTENIDOS MÍNIMOS

Materia y Energía. Propiedades Físicas y Químicas. Sustancias, elementos y compuestos. Estado de agregación de la materia. Cambios de Estado. Estructura atómica. Números atómico y másico. Isótopos. Tabla periódica. Iones. Estado de oxidación. Nomenclatura. Ecuaciones químicas. Estequiometría de la molécula. Masa atómica relativa. Masa molecular relativa. Mol.

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA

Alguna vez se ha preguntado ¿por qué el hielo se derrite y el agua se evapora? ¿Por qué las hojas cambian de color en el otoño y como una bocina genera electricidad? ¿Por qué si se mantienen fríos los alimentos se retarda su descomposición y cómo nuestros cuerpos usan los alimentos para mantener la vida? La química proporciona estas respuestas y otras más.

La química estudia la materia, su composición, propiedades, estructura, los cambios que experimente y las leyes que gobiernan estos cambios.

Siempre que se produce un cambio de cualquier tipo, participa alguna forma de energía y cuando cualquier forma de energía se transforma en otra, indica que ha ocurrido ó se está efectuando un cambio.

MATERIA Y ENERGÍA

La palabra **materia** describe todas las cosas físicas que están alrededor: la computadora, el cuerpo humano, un lápiz, el agua, etc. Hace miles de años se creía que la materia estaba formada de cuatro componentes: tierra, fuego, aire y agua. Alrededor del año 400 a. C., el filósofo griego Demócrito sugirió que la materia estaba en realidad compuesta de pequeñas partículas. A estas partículas las llamó **átomos**.

La **materia** presenta ciertas propiedades esenciales: tiene masa y tiene volumen, ocupa espacio. La masa es la cantidad de material de que está compuesto algo.

Cuando la materia toma forma se denomina **cuerpo**.

La **energía** es la capacidad para producir un cambio, no posee masa y no ocupa un lugar en el espacio. Se sabe que la materia y la energía son interconvertibles.

La **ley de la conservación de la energía** establece que “La energía no se crea ni se destruye”. Esta ley la cumplen casi todos los tipos de reacciones, excepto aquellas en las cuales la cantidad de materia cambia, como ser las nucleares.


En síntesis, la **Química** estudia los cambios que experimenta la materia y la energía.

La **energía** se encuentra bajo muchas formas: calor, luz, sonido, energía química, energía mecánica, energía eléctrica, energía nuclear. Por lo general, estas formas son convertibles entre sí.

Constitución de la materia

A los materiales (tipos de materia) se les puede dar formas, cuando adquieren una forma característica constituyen lo que se conoce como cuerpos. Así, podemos distinguir distintos tipos de cuerpos: una silla, una lapicera, un escritorio, etc.

Todos los cuerpos están formados por materia, cualquiera sea su forma, tamaño o estado. Pero no todos ellos están formados por el mismo tipo de materia, sino que están compuestos de materias diferentes denominadas sustancias. Para examinar la sustancia de la que está compuesto un cuerpo cualquiera, éste puede dividirse hasta llegar a las moléculas que lo componen. Estas partículas tan pequeñas son invisibles a nuestros ojos, sin embargo, mantienen todas las propiedades del cuerpo completo. A su vez, las moléculas pueden dividirse en los elementos simples que la forman, llamados átomos.



En el año 1803, el científico Británico John Dalton perfeccionó la idea de Demócrito sobre los átomos y desarrolló la primera teoría atómica. La teoría de Dalton enunciaba que toda la materia estaba compuesta de pequeñas partículas llamadas átomos. Dalton enunció que los diferentes tipos de materia estaban constituidos de diferentes tipos de átomos. Es esta una simple pero revolucionaria teoría. Dado que Dalton sabía que existía un número limitado de sustancias químicamente puras llamadas **elementos**, partió de la hipótesis que estos diferentes elementos estaban constituidos de diferentes tipos de átomos. Más adelante se verá en detalle esta Teoría.

Se conocen alrededor de 118 elementos diferentes. Los elementos son sustancias puras que no pueden ser descompuestas por medios químicos. Por ejemplo, el cobre no puede ser químicamente cambiado a otra sustancia. A cada uno se les ha dado un símbolo de una o dos letras para que sean fáciles de escribir. Por ejemplo, sodio puede ser abreviado usando el símbolo Na.

La pequeñez de los átomos supera la imaginación. Los átomos son tan pequeños que pueden colocarse unos 100 millones de ellos uno después de otro, en un centímetro lineal. Su radio es del orden de 10^{-8} cm. A su vez, los núcleos tienen dimensiones lineales 10.000 a 100.000 veces más pequeñas que el radio. El radio nuclear es del orden de 10^{-12} a 10^{-13} cm. En términos de volumen, los átomos ocupan como 10^{-24} cm³ y los núcleos 10^{-38} cm³.

Propiedades de la materia

Los sentidos permiten apreciar distintas cualidades de la materia, como ser dilatación, elasticidad, color, brillo, dureza, el volumen, etc. Todas estas propiedades se pueden clasificar en dos grupos (Tabla 1):

Tabla 1: Propiedades Extensivas e Intensivas de la materia

Propiedades Extensivas	Propiedades Intensivas
Son aquellas que varían al modificarse la cantidad de materia considerada	Son aquellas que no varían al modificarse la cantidad de materia considerada
Ejemplos: Peso, Volumen, Superficie, Longitud	Ejemplos: Punto de ebullición, punto de fusión, dureza, forma cristalina

La materia que en condiciones normales de presión hierve a 100 °C y solidifica a 0 °C, es la sustancia pura Agua. La materia sólida cuyo peso específico es de 19 g/cm³, es la sustancia pura Oro.


Nota: Si desconoces algunos de los términos dados, investiga de que se trata.

SISTEMAS MATERIALES

Se denomina **Sistema Material** a la parte del Universo que es objeto de estudio. Dicho sistema se separa del resto del universo, ya sea en forma real o imaginaria.


Los sistemas materiales se pueden clasificar de diferentes formas. Si se clasifican según sus propiedades pueden ser: homogéneos o heterogéneos.

Sistema homogéneo



Un **SISTEMA HOMOGÉNEO** se define como un sistema en el cual los valores de sus propiedades intensivas son iguales en cualquier punto del sistema en el que se midan.

Sistema heterogéneo



En un **SISTEMA HETEROGÉNEO** el valor que tiene una propiedad intensiva varía según sea la porción del sistema en el que se esté midiendo.

Figura 1: Sistemas homogéneo y heterogéneo

Las partes de un sistema heterogéneo en las cuales una **propiedad intensiva** presenta el mismo valor se denominan fases. Por lo tanto, un sistema heterogéneo tiene más de una fase, y un sistema homogéneo presenta una única **fase**. En un sistema heterogéneo existe un límite bien definido entre una fase y otra. Ese límite entre las distintas fases se denomina **interfase**.

Por supuesto, el que un sistema pueda verse como homogéneo depende del límite de apreciación. Un sistema que a simple vista puede parecer homogéneo, como la leche o la sangre, al verlo al microscopio se ve como un sistema heterogéneo. Por eso, el límite que se toma para decidir si un sistema es homogéneo o heterogéneo no es lo que se puede ver a simple vista sino el límite visible al microscopio. La leche y la sangre son sistemas heterogéneos, por más que a simple vista parezcan homogéneos.

¿Cómo se puede saber si un sistema material está formado por uno o más componentes? La forma de poder saberlo es tratar de separar esos componentes por métodos de separación. Los métodos de separación son métodos físicos. Una vez que se aplican los métodos de separación se llega a un punto que no se puede separar más, entonces se está en presencia de una **sustancia pura**.

“Una SUSTANCIA PURA es un sistema material formado por un único componente”

Por lo tanto una sustancia pura no se puede separar por métodos físicos y su composición es constante. Está caracterizada por una fórmula química definida.

Las soluciones son mezclas, pero son sistemas homogéneos. Es un tipo especial de mezcla, cuyas propiedades pueden ser muy diferentes a las de sus componentes. Como en cualquier mezcla, su composición es variable y para tener correctamente determinado el sistema, se debe conocer dicha composición. Por ejemplo: la salmuera (sal disuelta en agua) es una solución.

Las sustancias puras pueden clasificarse en **simples o compuestas**. Tanto las sustancias simples como las compuestas están constituidas por los elementos químicos. Las **sustancias simples** están formadas por un solo elemento, y las sustancias compuestas o compuestos están formadas por más de un elemento.

Elementos químicos son los constituyentes de todas las sustancias, tanto simples como compuestas. Por ejemplo el elemento oxígeno es lo que es común en las sustancias: oxígeno (O_2 , el gas componente del aire), al ozono (O_3), al agua (H_2O), al óxido de calcio (CaO), al ácido sulfúrico (H_2SO_4) y otras sustancias.

ESTADOS DE LA MATERIA

La materia puede presentarse en tres estados diferentes de agregación: sólido, líquido y gaseoso.

Los nombres de los distintos cambios de estado se muestran en el siguiente esquema (figura 2):




Figura 2: Cambios de Estados

Sublimación: es el pasaje del estado gaseoso a sólido

Volatilización: el pasaje desde el estado sólido al estado gaseoso (por ejemplo la naftalina)

Solidificación: es el pasaje desde el estado líquido al estado sólido (ejemplo: congelar el agua en el freezer)

Fusión: es el pasaje desde el estado sólido al estado líquido (ejemplo: cuando se derrite la manteca en el calor)

Vaporización: es el pasaje desde el estado líquido al estado gaseoso (ejemplo: cuando el agua entre en ebullición)

Condensación: es el pasaje desde el estado gaseoso al estado líquido (por ejemplo la formación de la lluvia).

Ejercicios

1. Según el siguiente listado determinar a quién consideras **cuerpo** y a que estimas **materia**:
 - a) Agua
 - b) Cubito de hielo
 - c) Lápiz
 - d) Acero
 - e) Hierro
 - f) Tenaza
 - g) Aluminio
 - h) Clavo
 - i) Oxígeno
 - j) Botella
 - k) Aire
 - l) Papel
 - m) Madera
 - n) Alcohol

2. De las siguientes propiedades indicar cuales son intensivas y cuales son extensivas:
 - a) Longitud
 - b) Punto de ebullición
 - c) Peso
 - d) Color
 - e) Dureza
 - f) Peso específico
 - g) Calor
 - h) Masa
 - i) Punto de solidificación

3. Del siguiente listado indicar cuales son mezclas heterogéneas, cuales son sustancias puras y cuales soluciones.
 - a) Madera
 - b) Vino
 - c) Sal
 - d) Una barra de oro de un banco suizo
 - e) Leche

4. Determinar si los siguientes cambios son físicos o químicos
 - a) Fusión del hielo
 - b) Cocción de un huevo para endurecerlo
 - c) Disolver sal en agua
 - d) Descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno

5. Identificar cada una de las siguientes sustancias como gases, líquidos y sólidos, en condiciones ordinarias
 - a) Mercurio
 - b) Hierro
 - c) Oxígeno
 - d) Aluminio
 - e) Alcohol
 - f) Agua
 - g) Cloro
 - h) Hielo

6. Dar ejemplos de fusión y solidificación distintos a los que se mencionaron anteriormente.

7. Para investigar: ¿Cuál es la diferencia entre ebullición y evaporación?

MODELOS ATÓMICOS

Existen distintas teorías o modelos que describen la estructura y propiedades de los átomos. Los mismos fueron postulados por diversos científicos. El primer modelo fue de J. Dalton, y a partir de este, los siguientes fueron evolucionando hasta llegar al actual modelo de Schrödinger. A continuación se realiza una breve descripción de cada uno.

Modelo Atómico de Dalton

En 1808, el químico británico John Dalton postuló su teoría atómica, que sostenía lo siguiente:

- 1) Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, llamadas **átomos**, que no se alteran en los cambios químicos.
- 2) Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades.
- 3) Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos del elemento hidrógeno y 1 átomo del elemento oxígeno.
- 4) Los átomos de dos o más elementos pueden combinarse en proporciones distintas para formar compuestos diferentes.
- 5) La proporción de átomos más común es 1:1 y cuando existe más de un compuesto formado por dos o más elementos, el más estable es el que tiene la proporción 1:1.

Hoy sabemos que ninguno de estos postulados es completamente cierto; sin embargo, Dalton contribuyó enormemente a entender cómo estaba formada la materia.

En la siguiente figura se presentan algunos símbolos de los elementos usados por Dalton.



Figura 3. Símbolos usados por Dalton para representar a los elementos

Modelo Atómico de Thomson

En 1904, el físico inglés J.J. Thomson sostenía que un átomo estaba formado por partículas de cargas positiva y negativa. Consideraba que las partículas negativas eran mucho más pequeñas que las positivas y por lo tanto, la mayor parte de la masa del átomo presentaba carga positiva, ocupando así, la mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó al átomo como una especie de esfera positiva continua en la que se encontraban incrustadas las partículas negativas. Representó al átomo como un budín con pasas de uvas.




Figura 4: Átomo de Thomson

Modelo Atómico de Rutherford

Este modelo fue postulado por el científico Rutherford en 1911. El mismo establece que:

El átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada la carga positiva y prácticamente toda la masa.

La carga positiva de las partículas llamadas **protones** es compensada con la carga negativa de los **electrones**, que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en igual cantidad que de electrones, lo que hace que el átomo sea eléctricamente neutro. Los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo y están separados de éste por una gran distancia.

Rutherford supuso que el átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío, ocupado por electrones que giran alrededor de un núcleo central muy denso y pequeño (figura 5).




Figura 5. Átomo de Rutherford

Modelo Atómico de Bohr

En 1913, el físico danés Niels Bohr realizó una serie de estudios de los cuales dedujo que los electrones de la corteza giran alrededor del núcleo describiendo sólo determinadas regiones conocidas como órbitas.

En el átomo, los electrones se organizaban en capas y, en cada capa tendrían una cierta energía, llenando siempre las capas inferiores y después las superiores. La distribución de los electrones en las capas la denominó configuración electrónica. En la figura 6 se presenta el átomo de Bohr.




Figura 6. Átomo de Bohr

Modelo Atómico de Schrödinger

En 1926, el científico Schrödinger presentó un modelo de átomo plenamente cuántico, donde desaparecían dos conceptos básicos del modelo anterior: Los electrones ya no se consideraban solo **partículas** sino también **ondas** y no existían órbitas electrónicas sino regiones donde se encontraban los electrones a las que denominó **orbital** (figura 7).




Figura 7. Átomo de Schrödinger

Esquema General de un Átomo

En la figura 8 se presenta un esquema general de un átomo.




Figura 8. Esquema de un átomo

Núcleo de átomo: es la parte central y contiene a los protones y neutrones.

Protones: partículas con carga positiva.

Neutrones: partículas sin carga y tienen una masa y tamaño similar a los protones.

Electrones: giran alrededor del núcleo en orbitales. Presentan carga negativa y tienen una masa y tamaño dos mil veces menor que los protones y neutrones.

TABLA PERIÓDICA

La tabla periódica es una tabulación de los elementos químicos, donde los mismos se acomodan en orden creciente de sus números atómicos, por lo que sus propiedades químicas y físicas son repetitivas, es decir, presentan un patrón periódico. Se construyó de manera que cada columna vertical contenga elementos similares desde el punto de vista químico. Los elementos de las columnas se llaman **grupos o familias**, mientras que cada fila de la tabla se denomina **periodo**.

Hay tres zonas diferentes en la tabla periódica, **los elementos representativos ó principales** (que se identifican como 1A, 2A y así sucesivamente hasta el 8A), **los elementos de transición** (que se designan con 1B, 2B y así sucesivamente hasta el 8B) y **los elementos de transición interna**.

Un patrón que es evidente cuando los elementos se distribuyen en la tabla periódica es el grupo de los **elementos metálicos**. Estos elementos, que aparecen agrupados a la izquierda de la tabla periódica, tienen algunas propiedades características como brillo y alta conductividad del calor y la electricidad. Los elementos metálicos están separados de los **elementos no metálicos** por una línea diagonal que va desde el Boro hasta el Astato y carecen de las características físicas que distinguen a los elementos metálicos. Algunos elementos que se encuentran a lo largo de la línea que separa metales de no metales, tales como Antimonio, poseen propiedades intermedias a estos, por lo que se conocen como **metaloides**. En la figura 9 se presenta un modelo de tabla periódica.

TABLA PERIÓDICA

Elementos Representativos												Elementos Representativos											
1ª												8A											
1	2A											Elementos de transición						3A	4A	5A	6A	7A	2
H												5	6	7	8	9	10	He					
3	4											13	14	15	16	17	18						
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne						
11	12	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	10B	1B	2B	Al	Si	P	S	Cl	Ar						
Na	Mg	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr						
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe						
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86						
Cs	Ba	Lantánidos	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Be	Po	At	Rn						
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112												
Li	Ra	Actínidos	104	105	106	107	108	109	110	111	112												


	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Lantánidos	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Td	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Actínidos	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Elementos de Transición Interna

Figura 9. Tabla Periódica

Número atómico: Es el primer orden que presenta la tabla periódica. *Indica el número de protones del núcleo* y determina las propiedades químicas de un elemento. Se suele simbolizar con la letra **Z**. Cada elemento tiene diferente número atómico. Un elemento puede identificarse por su nombre o por su número atómico. Los mismos se especifican empleando un subíndice antes del símbolo del elemento. Por ejemplo, el carbono se designa como ${}_6\text{C}$. También indica la cantidad de electrones que tiene un átomo neutro.

Número másico: Indica el número total de protones más el número total de neutrones de un átomo. Este se simboliza con la letra **A**. Los números másicos se especifican empleando un superíndice antes del símbolo del elemento. Por ejemplo, el carbono se designa como ^{12}C .



Isótopos: Son los átomos que tienen el mismo número de protones, pero número diferente de neutrones. El número de neutrones no afecta las propiedades químicas de los átomos de manera apreciable, por lo que todos los isótopos de un elemento dado tienen fundamentalmente las mismas propiedades químicas. No obstante, los distintos isótopos tienen masa diferente y propiedades nucleares distintas.

Ejercicios

1) Completar la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo	Z	N° electrones	A	N° neutrones
Carbono	C	6		12	
Sodio		11			12
Bromo	Br				
			47	108	
	As	33			

2) Escribir los símbolos correctos con sus subíndices y superíndices para cada uno de los siguientes elementos:

- a) Potasio con masa 39
- b) Silicio con masa 29
- c) Cloro con masa 35
- d) Dos isótopos de azufre, uno con 16 neutrones y el otro con 18.

3) Indicar el número de protones, neutrones y electrones en cada uno de los siguientes casos:

- a) ^{13}C
- b) ^{27}Al
- c) ^{19}F
- d) ${}^6\text{Li}$
- e) ^{97}Mo

- 4) Utilizando la tabla periódica escribir los símbolos de cada uno de los elementos, localícelos e indique si es metal, no metal o metaloide.
- Manganeso
 - Bromo
 - Cromo
 - Selenio
 - Argón
- 5) Que pareja de cada uno de los siguientes grupos de elementos se espera que tengan las propiedades físicas y químicas parecidas? Explicar.
- Ca, Si, I, P, Sr, Sc
 - Mg, Al, S, I, Sb, Ga.


IONES

Se sabe que todo átomo, en su estado libre, presenta igual cantidad de protones y electrones, es decir, que la suma de cargas positivas y cargas negativas es igual a cero, por lo tanto es eléctricamente neutro.

Por otro lado, cuando un átomo gana o pierde electrones, se convierte en un átomo cargado denominado **ion**. Si el átomo gana electrones queda cargado negativamente y dicho ion se denomina **anión**. Si pierde electrones queda cargado positivamente y se llama **cación**.

El número de electrones ganados o perdidos se denomina número de oxidación y la cantidad de situaciones diferentes se identifica con los estados de oxidación del elemento.

Ejemplo:



Ejercicios

1) Indicar la cantidad de e⁻ y p⁺ que presenta cada ion:

- a) Na⁺¹ b) Ca²⁺ c) Al³⁺ d) Li¹⁺ e) F¹⁻ f) O²⁻ g) Cl¹⁻

NOMENCLATURA QUÍMICA

La nomenclatura química es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos aquellos elementos y compuestos químicos. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, y se encarga de establecer las reglas correspondientes.

El objetivo de la formulación y nomenclatura química es que a partir del nombre de un compuesto se pueda conocer cuál es su fórmula, y a partir de la fórmula, se pueda saber cuál es su nombre. Con la fórmula se pueden obtener datos de importancia cuantitativa y estructural en la química y disciplinas relacionadas.

Electroneutralidad

Todos los compuestos son eléctricamente neutros. Por lo tanto, la suma de carga de los iones que los forman debe ser cero. Por ello, en un compuesto debe haber tantas cargas positivas como negativas.

Valencia

Es la capacidad que tiene un átomo de un elemento para combinarse con los átomos de otros elementos y formar compuestos.

Número de Oxidación

El número de oxidación es un entero positivo o negativo (creado por conveniencia entre los químicos). Los átomos, al ganar o perder electrones, adquieren una carga eléctrica que corresponde a la cantidad de electrones ganados o perdidos. La representación de esta carga se conoce como número de oxidación, el cual es diferente a la valencia, que es la capacidad de combinación de un elemento.

El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones, o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos. Será negativo cuando el átomo gane electrones, o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos.

En la siguiente tabla se indican los números de oxidación para algunos elementos.

Tabla 2. Nombre y n° de oxidación de los elementos más utilizados de la Tabla Periódica

Elementos	N°oxid.	Elementos	N°oxid.	Elementos	N°oxid.	Elementos	N°oxid
Antimonio	3+ 5+	Cloro	1- 1+ 3+ 5+ 7+	Iodo	1- 1+ 3+ 5+ 7+	Plata	1+
Aluminio	3+	Cobalto	2+ 3+	Litio	1+	Platino	2+ 4+
Arsénico	3- 3+ 5+	Cobre	1+ 2+	Magnesio	2+	Plomo	2+ 4+
Azufre	2- 4+ 6+	Cromo	2+ 3+ 6+	Manganeso	2+ 3+ 4+ 6+ 7+	Potasio	1+
Bario	2+	Estaño	2+ 4+	Mercurio	1+ 2+	Rubidio	1+
Boro	3- 3+	Estroncio	2+	Nitrógeno	3- 3+ 5+	Selenio	2-
Bromo	1- 1+ 3+ 5+ 7+	Flúor	1-	Níquel	2+ 3+	Silicio	4+
Cadmio	2+	Fósforo	3- 3+ 5+	Oxígeno	2-	Sodio	1+

Calcio	2+	Hidrógeno	1+ 1-	Oro	1+ 3+	Telurio	2-
Carbono	4- 2+ 4+	Hierro	2+ 3+	Paladio	2+ 4+	Zinc	2+

SISTEMAS DE NOMENCLATURA

Los sistemas de nomenclatura de compuestos inorgánicos que se verán en este curso son:

Nomenclatura Stock

Según este sistema, cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de un número de oxidación, éste se indica al final del nombre, expresado en números romanos y entre paréntesis. Por ejemplo, $\text{Fe}(\text{OH})_2$: Hidróxido de hierro (II), $\text{Fe}(\text{OH})_3$: Hidróxido de hierro (III)

Nomenclatura Sistemática

En este sistema se utilizan prefijos griegos (*mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc.*) para indicar la cantidad de átomos que forman parte de la molécula. Por ejemplo, Cl_2O_3 : trióxido de dicloro.

Nomenclatura Tradicional

Este sistema es uno de los más antiguos que aún se emplea. Cuando un elemento presenta más de un número de oxidación, se utilizan prefijos y sufijos, tales como *hipo, per* para los primeros; y *oso* e *ico*, para los segundos.

No. DE ESTADOS DE OXIDACIÓN	ESTADOS DE OXIDACIÓN	PREFIJO	SUFIJO
1	Único	----	ico (o el nombre del elemento)
2	Menor	----	oso
	Mayor	----	ico
3	Menor	Hipo	oso
	Intermedio	----	oso
	Mayor	----	ico
4 (Cl, Br y I)	Menor	Hipo	oso
	Intermedio menor	----	oso
	Intermedio mayor	----	ico
	Mayor	Per	ico

CLASIFICACIÓN DE COMPUESTOS

Los compuestos se clasifican según la cantidad de átomos de elementos en:

Compuestos binarios: están formados por dos clases de elementos. Se clasifican en:

- Combinaciones con el oxígeno (óxidos básicos y ácidos, peróxidos y superóxidos)
- Combinaciones con el hidrógeno (hidruros metálicos, hidruros no metálicos e hidrácidos)
- Sales binarias

Compuestos ternarios: están formados por tres tipos de elementos:


- Hidróxidos
- Oxoácidos (ó ácidos oxigenados)
- Oxosales (ó sales oxigenadas)

- Sales binarias ácidas

Compuestos cuaternarios: están formados por cuatro tipos de elementos:

- Sales oxigenadas ácidas


En este curso, solo se verán los principales tipos de compuestos según se muestra en la siguiente figura:



1. ÓXIDOS


Los óxidos se forman de la unión de los elementos con el oxígeno, se clasifican en los óxidos metálicos ó básicos y los óxidos no metálicos ó ácidos.

A- Óxidos Metálicos ó Básicos




- ❖ Se escribe el símbolo del metal más el oxígeno.
- ❖ El subíndice del metal coincide con el n° de oxidación del oxígeno (2-) y viceversa.
- ❖ Se deben simplificar los subíndices en caso de que sean múltiplos entre sí.

Nomenclatura Stock: óxido + metal (n° oxid. del metal entre paréntesis en caso de que el mismo tenga más de un n° de oxidación)



B- Óxidos No Metálicos ó Ácidos



- ❖ Se escribe el símbolo del no metal más el oxígeno.
- ❖ El subíndice del no metal será el nº de oxidación del oxígeno (2-) y el subíndice del oxígeno (n), el del no metal.
- ❖ Se deben simplificar los subíndices en caso de que sean múltiplos entre sí.

Ejemplos:



{ Nomenclatura Sistemática: trióxido de dinitrógeno
Nomenclatura de Stock: óxido de nitrógeno (III)
Nomenclatura Tradicional: óxido **nítroso**



{ Nomenclatura Sistemática: heptóxido de dicloro
Nomenclatura de Stock: óxido de cloro (VII)
Nomenclatura Tradicional: óxido **perclórico**

Ejercicios

Fórmula	N. Stock	N. Sistemática	N. Tradicional
MgO		Monóxido de magnesio	Óxido de magnesio
NiO	Óxido de níquel (II)		Oxido níqueloso
		Trióxido de diníquel	Oxido níquelico
SnO ₂	Oxido de estaño (IV)		
Fe ₂ O ₃			
PbO ₂			
	Óxido de oro (I)		
			Óxido estanoso
	Óxido de bromo(I)	Monóxido de dibromo	
SeO ₂	Óxido de selenio(IV)		
	Oxido de yodo (VII)		
As ₂ O ₅			Oxido arsénico
		Pentóxido de dinitrógeno	

1. PERÓXIDOS




- ❖ Se escribe el símbolo del metal seguido del ion peróxido.
- ❖ Se deben colocar los subíndices siguiendo el principio de electroneutralidad.

❖ El subíndice característico del ion peróxido nunca se debe simplificar.

Nomenclatura: Peróxido + metal

Ejemplos:




Ejercicios

Fórmula	N. Tradicional
	Peróxido de hidrógeno = Agua oxigenada
Li_2O_2	
Na_2O_2	
	Peróxido de plata
	Peróxido de bario

2. HIDRUROS

Los hidruros se forman de la unión de los elementos con el hidrógeno, se clasifican en hidruros metálicos e hidruros no metálicos



A- Hidruros Metálicos



- ❖ El hidrógeno actúa como no metal, es en el único caso que usa número de oxidación (1-).
- ❖ El número de átomos de hidrógeno (n) será igual al número de oxidación del metal, cumpliéndose así el principio de neutralidad.
- ❖ Se escribe el símbolo del metal seguido del hidrógeno.

Nomenclatura Stock: Hidruro + nombre del metal (nº de oxidación del metal si tiene más de un nº de oxidación)


Ejemplos:



Ejercicios

Fórmula	N. Stock	N. Sistemática	N. Tradicional
NaH	Hidruro de sodio		
CuH ₂			Hidruro Cúprico
	Hidruro plomo(IV)	Tetrahidruro de plomo	
AuH ₃			
CsH	Hidruro de cesio		
	Hidruro de estaño(II)		
			Hidruro de plata

A- Hidruros No Metálicos (especiales)



- ❖ Se escribe el hidrógeno seguido del no metal.
- ❖ El número de oxidación del hidrógeno (1+).
- ❖ Hay no metales como el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y boro que forman compuestos con el hidrógeno y que reciben nombres especiales. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y el boro actúan con número de oxidación (3-) mientras que el carbono y el silicio lo hacen con número de oxidación (4-).
- ❖ El número de átomos de hidrógeno será igual al número de oxidación del no metal, cumpliéndose así el principio de neutralidad.

Nomenclatura Sistemática: Prefijo - Hidruro + nombre del no metal


Nomenclatura Tradicional: tienen nombres triviales que no siguen ninguna regla general

Ejemplos:



	Nomenclatura sistemática	Nomenclatura tradicional
NH ₃	Trihidruro de nitrógeno	Amoniaco
PH ₃	Trihidruro de fósforo	Fosfina
AsH ₃	Trihidruro de arsénico	Arsina
BH ₃	Trihidruro de boro	Borano
SbH ₃	Trihidruro de antimonio	Estibina
CH ₄	Tetrahidruro de carbono	Metano
SiH ₄	Tetrahidruro de silicio	Silano

B- HIDRÁCIDOS

- ❖ Se obtiene de la reacción del hidrógeno con los no metales: flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, telurio. En la siguiente ecuación química se demuestra la misma.




Nomenclatura Tradicional: se los nombra como con la terminación “hídrico” en medio acuoso (ac), y “uro” en estado gaseoso (g).



- ❖ Se escribe el hidrógeno seguido del no metal
- ❖ El número de oxidación del hidrógeno (1+).
- ❖ Se forman con los siguientes no metales: flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, telurio.
- ❖ Los no metales siempre actúan con el n° de oxidación negativo.
- ❖ El número de átomos de hidrógeno (n) será igual al número de oxidación del no metal, cumpliéndose así el principio de neutralidad.

Ejemplos:



Ejercicios



Fórmula	N. Tradicional (estado gaseoso)	N. Tradicional (solución acuosa)
HF		Ácido fluorhídrico
		Ácido clorhídrico
HBr		
HI		
H ₂ S		Ácido sulfhídrico
	Seleniuro de hidrógeno	
		Ácido telurhídrico

3. HIDRÓXIDOS (Función Básica)



- ❖ Se escribe el símbolo del metal seguido del ion oxhidrilo (OH⁻), cuyo n° de oxidación es (1-).

- ❖ Habrá tantos oxhidrilos (n) como n° de oxidación presente el metal.



Ejercicios

Fórmula	N. Stock	N. Sistemática	N. Tradicional
Cr(OH) ₂			
	Hidróxido de mercurio(II)		
	Hidróxido de sodio		
Mg(OH) ₂			Hidróxido de magnesio
Au(OH) ₃	Hidróxido de oro (III)	Trihidróxido de oro	
			Hidróxido plúmbico
Ni(OH) ₃			
		Dihidróxido de cadmio	


4. ÁCIDOS OXIGENADOS Ó OXOÁCIDOS (función ácida)



- ❖ Se escribe el hidrógeno, seguido del no metal, más el oxígeno.
- ❖ X es el no metal o metaloide. En este caso siempre actúa con n° de oxidación positivo.


En este curso solo se utilizará la nomenclatura tradicional para oxoácidos.

Nomenclatura Tradicional: ácido y nombre de no metal con terminación **OSO** (menor n° de oxidación) e **ICO** (mayor n° de oxidación)



Casos Especiales: Elementos como el **fósforo**, **arsénico**, **antimonio** (con n° de oxidación 3+ y 5+) y **boro** (con n° de oxidación 3+) forman, tres ácidos distintos. Estos se diferencian en el grado de hidratación. La nomenclatura tradicional además de usar los sufijos **oso** e **ico**, utiliza los prefijos **meta**, **piro** y **orto**

Ejemplo: Cuando el fósforo actúa con 5+



El **Cromo** tiene los siguientes n° de oxidación: 2+, 3+, 6+. Solo con el último actúa como no metal y forma ácidos. Ellos son:





El Manganeseo presenta los siguientes números de oxidación: 2+, 3+, 4+, 6+ y 7+. Solo con los tres últimos actúa como no metal y forma ácidos. Ellos son:



Ejercicios

Fórmula	N. Tradicional
HIO	
H_2SO_3	
	Ácido Iodoso
	Ácido nitroso
HPO_2	
$HBrO_4$	
	Ácido Carbónico


5. Sal Binaria

Hidrócido (H_nX) + Hidróxido ($M(OH)_n$) = Sal Binaria (M_nX_n) + Agua

Ejemplo:



Nomenclatura Tradicional: en el no metal, cambiamos “Hídrico” por “uro”; mientras que el metal conserva el nombre del hidróxido (con terminación “oso” o “ico”)




Ejercicios

Fórmula	N. Stock	N. Tradicional
CaF_2	Fluoruro de calcio	
$CoCl_3$		Cloruro cobáltico

	Bromuro de cadmio	
	Yoduro de cobre (II)	
PtS ₂		
Al ₂ Se ₃		

6. SALES OXIGENADAS NEUTRAS (OXOSALES)

Ácido oxigenado (H_aX_bO_c) + Hidróxido (M(OH)_n) = Sal oxigenada (M_aX_bO_c) + Agua




- ❖ Resultan de reemplazar **todos los hidrógenos** de los oxoácidos, por **metales**.
- ❖ Se escribe el símbolo del metal más el no metal seguido del oxígeno.
- ❖ El intercambio de n° de oxidación se realiza entre el metal y el anión poliatómico de la sal.
- ❖ Simplificar cuando sea necesario.

Nomenclatura Tradicional (se utilizará en este curso solo esta nomenclatura)

Su nombre se escribe de la siguiente manera:

- Nombre del **no metal** con sufijo “**ito**” (menor n° de oxidación) más nombre del **metal** con sufijo “**oso**” (menor n° de oxidación) ó “**ico**” (mayor n° de oxidación).
- Nombre del **no metal** con sufijo “**ato**” (mayor n° de oxidación) más nombre del **metal** con sufijo “**oso**” (menor n° de oxidación) ó “**ico**” (mayor n° de oxidación).

Ejemplos:



Ejercicios

Ácido	Nombre del ácido	Sal	Nombre de la sal
HIO ₃	Ácido iódico	Ca(IO ₃) ₂	Iodato de calcio
HBrO ₄		Li(BrO ₄)	
H ₂ SO ₃		Pb(SO ₃) ₂	
H ₂ SO ₄			Sulfato ferroso
H ₄ P ₂ O ₅			Pirofosfito auroso
HMnO ₄		K(MnO ₄)	
			Metarseniato férrico
			Metafosfato plúmbico
		Li ₂ (CO ₃)	
		Ba(ClO) ₂	
		Mg ₂ (P ₂ O ₇)	
			Perclorato mercúrico
			Nitrito de sodio
		Cu(BrO ₄) ₂	
		Ca(NO ₂) ₂	
			Bromato estáñico
		Fe(SO ₃)	
			Clorato mercurioso
		Al ₂ (SO ₄) ₃	
		Zn(IO ₃) ₂	

7. EJERCITACION NOMENCLATURA QUÍMICA

1. Escribir la fórmula de los siguientes compuestos:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a) Dióxido de carbono | k) Ácido fluorhídrico |
| b) Óxido cuproso | l) Hidruro de calcio |
| c) Óxido cloroso | m) Óxido cobaltoso |
| d) Hidruro de aluminio | n) Bromuro de hidrógeno |
| e) Sulfuro de calcio | o) Óxido de cromo (VI) |
| f) Cloruro áurico | p) Hidruro de bario |
| g) Bromuro de sodio | q) Carbonato ferroso |
| h) Óxido de zinc | r) Arsenamina |
| i) Trióxido de azufre | s) Sulfato ácido de sodio |
| j) Óxido de manganeso (VI) | t) Ortoarseniato de litio |

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| u) Ácido metafosfórico | dd) Ácido sulfúrico |
| v) Iodato de litio | ee) Ácido piroantimónico |
| w) Hidróxido cobáltico | ff) Hidróxido de aluminio |
| x) Carbonato de sodio | gg) Sulfuro de zinc |
| y) Sulfato de aluminio | hh) Hidróxido níquelico |
| z) Hidróxido de plata | ii) Nitrito plumboso |
| aa) Hidróxido cuproso | jj) Ácido periódico |
| bb) Ácido cloroso | kk) Ácido crómico |
| cc) Nitrato de cadmio | |

2. Escribir el nombre de los siguientes compuestos:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a) PbO_2 | q) H_2O |
| b) KOH | r) $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$ |
| c) CuCl_2 | s) KOH |
| d) CaBr_2 | t) HNO_3 |
| e) CuI | u) $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ |
| f) Fe_2O_3 | v) Na_2CO_3 |
| g) Al_2O_3 | w) H_3PO_3 |
| h) PbO | x) HgSO_4 |
| i) $\text{HCl}(\text{g})$ | y) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ |
| j) KI | z) K_2SO_4 |
| k) MnO_3 | aa) $\text{Ba}(\text{NO}_2)_2$ |
| l) Hg_2O | bb) HClO |
| m) Na_2O | cc) $\text{Sn}(\text{BrO}_2)_2$ |
| n) PtCl_4 | dd) Na_2CO_3 |
| o) $\text{HF}_{(\text{ac})}$ | ee) H_2CO_3 |
| p) SnO_2 | ff) $\text{Ni}(\text{OH})_2$ |

8. ESTEQUIOMETRÍA DE LA MOLÉCULA

La palabra Estequiometría se aplica a las relaciones entre los moles, masas o volúmenes que participan en una reacción química.

Una vez formulada la hipótesis de Dalton, el siguiente paso lógico fue determinar las masas relativas de los átomos de los elementos. Como no se puede determinar la masa individual de un átomo, las masas relativas fueron la mejor información disponible. Es decir, se propuso que el átomo de un elemento tenía una masa igual al doble de la del átomo de otro elemento distinto.

¿De qué manera se determinaron las masas relativas? Se tomaron números iguales de átomos (cantidades considerables) de diversos elementos y se determinó la proporción de masas en estos conjuntos de átomos. Por ejemplo, un número grande de átomos de carbono tiene una masa total de 12.0 g y un número igual de átomos de oxígeno tiene una masa total de 16.0 g. Como el número de átomos de cada tipo es igual, la proporción de masas de átomos de carbono con respecto a los de oxígeno es 12.0: 16.0

Transcurridos 50 años, se diseñó un método experimental para determinar las proporciones atómicas de los compuestos y se pudo establecer la escala de pesos atómicos relativos. Esos pesos relativos se llaman **pesos atómicos**.

El peso atómico del elemento más ligero, hidrógeno, se consideró originalmente como una **unidad de masa atómica (uma)**. Los valores modernos de los pesos atómicos se basan en el tipo de átomo de carbono más común, denominado carbono 12, y que se representa como ^{12}C . La masa del ^{12}C se define como un peso atómico de exactamente 12 uma. En esta escala el hidrógeno tiene un peso atómico de 1.008 uma

Una molécula es el conjunto de dos o más átomos. **El peso molecular** de una sustancia resulta de la suma de los pesos atómicos de cada átomo que contiene la molécula, representada mediante la fórmula química. Por ejemplo, el ácido sulfúrico (H_2SO_4) tiene un peso molecular de 98 uma.

$$\begin{aligned}\text{Peso molecular} &= 2(\text{p.a. del H}) + \text{p.a. del S} + 4(\text{p.a. del O}) \\ &= 2(1.0 \text{ uma}) + 32.0 \text{ uma} + 4(16.0 \text{ uma}) \\ &= 98.0 \text{ uma}\end{aligned}$$

MOL

Ya se ha indicado que el concepto de peso atómico es importante porque permite contar los átomos de manera indirecta, pesando las muestras. Un número conveniente de unidades de átomos moléculas, o fórmulas, es aquel número cuya masa en gramos es igual, desde el punto de vista numérico, al peso atómico. Esta cantidad se denomina **mol**. Así un mol de un átomo de ^{12}C es el número de átomos en 12.0 g. De manera experimental, se ha determinado que un **mol** de partículas contiene **6.022×10^{23} partículas**.

Por ejemplo:

$$1 \text{ mol de átomos de } ^{12}\text{C} = 6.022 \times 10^{23} \text{ átomos de } ^{12}\text{C}$$

$$1 \text{ mol de moléculas de H}_2\text{O} = 6.022 \times 10^{23} \text{ de moléculas de H}_2\text{O}$$

$$1 \text{ mol de iones NO}_3^- = 6.022 \times 10^{23} \text{ de iones NO}_3^-$$

Un mol de átomos de cualquier elemento tiene una masa en gramos que es numéricamente igual al peso atómico de un átomo sencillo. Por ejemplo, un átomo de oro tiene una masa de 197 uma, mientras que un mol de átomos de oro tiene una masa de 197g.

Esta idea puede generalizarse para incluir moléculas e iones. Es decir, la masa de un mol de moléculas de cualquier sustancia es siempre igual al peso molecular expresado en gramos. Por ejemplo, una molécula de agua tiene una masa de 18.0 uma, un mol de agua pesa 18.0 g.

Ejemplos:

$$1 \text{ mol de átomos de } ^{12}\text{C} = 6.022 \times 10^{23} \text{ átomos de } ^{12}\text{C} = 12.0 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol de moléculas de H}_2\text{O} = 6.022 \times 10^{23} \text{ de moléculas de H}_2\text{O} = 18.0 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol de iones NO}_3^- = 6.022 \times 10^{23} \text{ de iones NO}_3^- = 62.0 \text{ g}$$

EJERCICIOS


- 1) Definir y dar un ejemplo de cada uno de los siguientes términos:
a) átomo b) molécula c) ion
- 2) Con sus propias palabras describir la composición atómica de las siguientes moléculas:
a) He
b) O₂
c) CO₂
d) NH₃
e) C₂H₅OH
- 3) ¿Qué entiende por unidad de masa atómica (uma)?
- 4) ¿Qué es un mol? ¿Por qué es una unidad conveniente?
- 5) ¿Cuántos moles de átomos contienen cada una de los siguientes elementos?
a) 59.4 g de Al
b) 90.7 g de Pb
c) 101.0 g de Cu
- 6) ¿Cuántos moles de moléculas contienen cada una de las siguientes sustancias?
a) 59.4 g de peróxido de hidrógeno
b) 90.7 g de óxido plúmbico
c) 101.0 g de hidróxido níquelico
- 7) Determinar los gramos que hay en:
a) 2.5 mol de Cu
b) 1.8 mol de O₃
c) 8.4×10^{23} átomos de Zn
d) 6.8×10^{23} moléculas de N₂
e) 1.7 moles de sulfato férrico
f) 2.98×10^{23} moléculas de carbonato de calcio

Anexo- Tabla periódica

Tabla periódica de los elementos

grupo 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.00794 1.008 1.009	6.941 6.941 6.941	9.012182 9.012 9.012	12.0107 12.011 12.011	22.989769 22.990 22.990	24.30409 24.304 24.304	26.9815385 26.982 26.982	55.845 55.845 55.845	72.64 72.64 72.64	89.904 89.904 89.904	101.07 101.07 101.07	151.96 151.96 151.96	26.9815385 26.982 26.982	12.0107 12.011 12.011	14.0067 14.007 14.007	15.9994 15.999 15.999	18.998403 18.998 18.998	4.002602 4.003 4.003
1 H Hidrógeno	2 He Helio	3 Li Litio	4 Be Berilio	5 B Boro	6 C Carbono	7 N Nitrógeno	8 O Oxígeno	9 F Flúor	10 Ne Neón	11 Na Sodio	12 Mg Magnesio	13 Al Aluminio	14 Si Silicio	15 P Fósforo	16 S Azufre	17 Cl Cloro	18 Ar Argón
19 K Potasio	20 Ca Calcio	21 Sc Escandio	22 Ti Titanio	23 V Vanadio	24 Cr Cromo	25 Mn Manganeso	26 Fe Hierro	27 Co Cobalto	28 Ni Níquel	29 Cu Cobre	30 Zn Zinc	31 Ga Galio	32 Ge Germanio	33 As Arsénico	34 Se Selenio	35 Br Bromo	36 Kr Kriptón
37 Rb Rubidio	38 Sr Estroncio	39 Y Itrio	40 Zr Zirconio	41 Nb Niobio	42 Mo Molibdeno	43 Tc Tecnecio	44 Ru Rutenio	45 Rh Rodio	46 Pd Paladio	47 Ag Plata	48 Cd Cadmio	49 In Indio	50 Sn Estanio	51 Sb Antimonio	52 Te Telurio	53 I Yodo	54 Xe Xenón
55 Cs Cesio	56 Ba Bario	57 La Lantano	58 Ce Cerio	59 Pr Praseodimio	60 Nd Neodimio	61 Pm Prometio	62 Sm Samario	63 Eu Europio	64 Gd Gadolinio	65 Tb Terbio	66 Dy Disprosio	67 Ho Holmio	68 Er Erbio	69 Tm Tulio	70 Yb Iterbio	71 Lu Lutecio	72 Hf Hafnio
87 Fr Francio	88 Ra Radio	89 Ac Actinio	90 Th Torio	91 Pa Protactinio	92 U Urano	93 Np Neptunio	94 Pu Plutonio	95 Am Americio	96 Cm Curcio	97 Bk Berkelio	98 Cf Californio	99 Es Einsteinio	100 Fm Fermio	101 Md Mendelevio	102 No Nobelio	103 Lr Lawrencio	104 Rf Rutherfordio
117 Ts Teneso	118 Og Oganesson	119 Uue Ununennio	120 Uuo Ununoctio	121 Uuq Ununquettio	122 Uub Unubio	123 Uut Ununtrio	124 Uuq Ununquettio	125 Uub Unubio	126 Uut Ununtrio	127 Uuq Ununquettio	128 Uub Unubio	129 Uut Ununtrio	130 Uuq Ununquettio	131 Uub Unubio	132 Uut Ununtrio	133 Uuq Ununquettio	134 Uub Unubio

138.9054 138.905 138.905	140.116 140.116 140.116	140.9076 140.908 140.908	144.242 144.242 144.242	145 145 145	150.36 150.36 150.36	151.964 151.964 151.964	157.25 157.25 157.25	162.500 162.500 162.500	164.9303 164.930 164.930	167.259 167.259 167.259	168.9342 168.934 168.934	173.054 173.054 173.054	
La Lantano	Ce Cerio	Pr Praseodimio	Nd Neodimio	Pm Prometio	Sm Samario	Eu Europio	Gd Gadolinio	Tb Terbio	Dy Disprosio	Ho Holmio	Er Erbio	Tm Tulio	Yb Iterbio
227 227 227	232.0380 232.038 232.038	231.0358 231.036 231.036	238.0289 238.029 238.029	237 237 237	244 244 244	243 243 243	247 247 247	247 247 247	251 251 251	252 252 252	257 257 257	258 258 258	259 259 259
Ac Actinio	Th Torio	Pa Protactinio	U Urano	Np Neptunio	Pu Plutonio	Am Americio	Cm Curcio	Bk Berkelio	Cf Californio	Es Einsteinio	Fm Fermio	Md Mendelevio	No Nobelio



notas

- por ahora, los elementos 113, 115, 117 y 118 no tienen nombre oficial designado por la IUPAC.
- 1 kJ/mol = 96.485 eV.
- todos los elementos tienen un estado de oxidación implícito cero.

9. BIBLIOGRAFÍA

1. Atkins P. et al. Inorganic Chemistry 4^a ed. Freeman. EE.UU. 2006.
2. Brown L., LeMay H., Bursten B. Química: La Ciencia Central. 9^a ed. Pearson Educación. México. 2004.
3. Burns R. Fundamentos de Química 1. 4^a ed. Pearson Prentice Hall. México. 2004.
4. Chang R., College W. Química General. 7^a ed. Mc Graw Hill. Colombia. 2002.
5. Masterton W., Hurley C. Principios y Reacciones. Química. 4^a ed. Thomson. España. 2004.
6. Mc Murry J. Fay R. Química General. 5^a ed. Pearson Prentice Hall. México. 2003.
7. Petrucci R., Harwood W., Herring F. Química General. Enlace Químico y Estructura de la materia. Volumen I. 8^a ed. Pearson Prentice Hall. España. 2003.
8. Whitten K., Davis R., Peck M. Stanley J. Química General. 8^a ed., Mc. Graw Hill. México. 2011.
9. Zumdahk S. Fundamentos de la Química. Mc. Graw Hill. México. 1992.

Contenido

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA	2
MATERIA Y ENERGÍA.....	2
Constitución de la materia	2
Propiedades de la materia.....	3
SISTEMAS MATERIALES	3
Sistema homogéneo.....	4
ESTADOS DE LA MATERIA.....	5
Ejercicios.....	6
MODELOS ATÓMICOS.....	7
Modelo Atómico de Dalton	7
Modelo Atómico de Thomson.....	7
Modelo Atómico de Rutherford	8
Modelo Atómico de Bohr	8
Modelo Atómico de Schrödinger.....	8
TABLA PERIÓDICA.....	10
Ejercicios.....	11
IONES.....	12
Ejercicios.....	12
NOMENCLATURA QUÍMICA.....	13
Electroneutralidad	13
Valencia	13
Número de Oxidación.....	13
SISTEMAS DE NOMENCLATURA	14
Nomenclatura Stock	14
Nomenclatura Sistemática	14
Nomenclatura Tradicional	14
1. ÓXIDOS	15
A- Óxidos Metálicos ó Básicos	15

B- Óxidos No Metálicos ó Ácidos	16
1. PERÓXIDOS	16
2. HIDRUROS.....	17
A- Hidruros Metálicos	17
A- Hidruros No Metálicos (especiales).....	18
B- HIDRÁCIDOS.....	18
3. HIDRÓXIDOS (Función Básica)	19
4. ÁCIDOS OXIGENADOS Ó OXOÁCIDOS (función ácida).....	20
5. Sal Binaria	21
6. SALES OXIGENADAS NEUTRAS (OXO SALES)	22
7. EJERCITACION NOMENCLATURA QUÍMICA.....	23
8. ESTEQUIOMETRÍA DE LA MOLÉCULA	25
EJERCICIOS	26
9. BIBLIOGRAFÍA	28